

Bras et cuisses pendants, flottants : le lifting de cuisses ou des bras

L'intervention

Elle se réalise sous anesthésie générale.


Un dessin est réalisé sur le patient pour placer les cicatrices le plus possible cachées (sous le bras ou entre les cuisses).

La peau en excès avec sa graisse sous-jacente est retirée, tout en décollant la zone restante pour pouvoir fermer.

Des sutures solides au fil résorbable sont réalisées.

Des drains ou de lames de drainage sont placées pour vider le sang.

Des bandages serrés sont réalisés.



Les suites

La sortie s'effectue entre 24 et 72 heures selon l'état de fatigue post opératoire.

Des antalgiques, anticoagulants et pansements à domicile sont prescrits.

Des vêtements compressifs type brassière ou manchon sont très utiles pour permettre aux tissus de dégonfler.

Une consultation à une semaine est nécessaire pour vérifier la bonne réalisation des pansements et de la cicatrisation.

Du repos et un arrêt de travail pour un mois sont indispensables.

Au deuxième mois, des massages et des séances de kiné seront là pour améliorer la souplesse des tissus.

Les complications

Hématomes, infection sont rares mais à rechercher dans les premiers jours et à nettoyer.

Des retards de cicatrisation avec lâchage de suture peuvent survenir.

Des problèmes cicatriciels sont souvent présents avec cicatrices larges ou hypertrophiques (surtout pour les bras).

Des phlébites (caillots veineux responsable d'une inflammation locale) peuvent survenir si non prévenues par une mobilisation précoce.

Le tarif

Les liftings de cuisse ou de bras sont des interventions pouvant être prises en charge par la sécurité sociale après acceptation de l'entente préalable.

Si acceptation vous paierez les dépassements d'honoraires du dr NICOLAS ZWILLINGER et de l'anesthésiste.

Si refus de la sécurité sociale, vous paierez les frais de la clinique en plus.

Conclusion

Des bras ou des cuisses liftés, c'est une silhouette moins massive et sans les séquelles d'un amaigrissement important.

Le patient n'a plus honte d'exhiber ses bras en T-shirt ou de se mettre en short.